

Nom Latin	
<i>Agaricus silvicola</i> (Vittadini) Peck	agaric anisé des bois ou silvicole
<i>Agaricus essettei</i> M. Bon ex M. Bon	agaric dédié à Essette
<i>Agaricus langei</i> (F.H. Møller) F.H. Møller	agaric dédié à Lange
<i>Agaricus silvaticus</i> J.C. Sch.	agaric des bois
<i>Agaricus arvensis</i> J.C. Sch. : Fr.	agaric des jachères (champs)
<i>Agaricus bitorquis</i> (Quélet) Saccardo	agaric des trottoirs
<i>Agaricus benesii</i> (Pilát) Singer	agaric squamuleux
<i>Fomes fomentarius</i> (L. : Fr.) Fr.	amadouvier
<i>Amanita citrina</i> (J.C. Sch.) Pers.	amanite citrine
<i>Amanita strobiliformis</i> (Paulet ex Vittadini) Bertillon	amanite en forme de cône
<i>Amanita vaginata</i> (Bull. : Fr.) Vittadini	amanite engainée
<i>Amanita junquillea</i> Quélet	amanite jonquille
<i>Amanita pantherina</i> (de Candolle : Fr.) Krombholz	amanite panthère
<i>Amanita phalloides</i> (Fr. : Fr.) Link	amanite phalloïde
<i>Amanita porphyria</i> Alb. & Schw. : Fr.	amanite porphyre
<i>Amanita rubescens</i> (Pers. : Fr.) Pers.	amanite rougissante, golmotte
<i>Amanita crocea</i> (Quélet) Singer	amanite safran
<i>Amanita muscaria</i> (L. : Fr.) Lamarck	amanite tue-mouche
<i>Clathrus archeri</i> (Berk.) Dring	anthurus d'Archer
<i>Armillaria cepistipes</i> Velenovsky	armillaire à pied en bulbe d'oignon
<i>Armillaria gallica</i> Marxmüller & Romagnesi	armillaire bulbeuse
<i>Armillaria mellea</i> (Vahl : Fr.) Kummer	armillaire couleur de miel
<i>Armillaria ostoyae</i> (Romagnesi) Herink	armillaire d'ostoya
<i>Catathelasma imperiale</i> (Quélet) Singer	armillaire impériale
<i>Astraeus hygrometricus</i> (Pers. : Pers.) Morgan	astrée hygométrique
<i>Xerocomus subtomentosus</i> (L. : Fr.) Quélet	bolet subtomenteux
<i>Xerocomus chrysenteron</i> (Bull.) Quélet	bolet à chair jaune
<i>Boletus erythropus</i> Pers. : Fr.	bolet à pied rouge
<i>Xerocomus badius</i> (Fr. : Fr.) Kühner ex E.-J. Gilbert	bolet bai
<i>Leccinum floccopus</i> (E.-J. Gilbert) Redeuilh	bolet changeant
<i>Aureoboletus gentilis</i> (Quélet) Pouzar	bolet cramois
<i>Leccinum variicolor</i> Watling	bolet de couleur variée
<i>Suillus bovinus</i> (L. : Fr.) Roussel	bolet des bouviers
<i>Suillus granulatus</i> (L. : Fr.) Roussel	bolet grannulé
<i>Suillus viscidus</i> (L.) Roussel	bolet gris des mélèzes
<i>Suillus luteus</i> (L. : Fr.) Roussel	bolet jaune nonette voilée
<i>Suillus plorans</i> (Rolland) O. Kuntze	bolet larmoyant
<i>Gyrodon lividus</i> (Bull. : Fr.) P. Karsten	bolet livide
<i>Suillus variegatus</i> (Swartz : Fr.) Richon & Roze	bolet moucheté, tacheté
<i>Leccinum aurantiacum</i> (Bull.) S.F. Gray	bolet orangé
<i>Chalciporus piperatus</i> (Bull. : Fr.) Bataille	bolet poivré
<i>Strobilomyces strobilaceus</i> (Scop. : Fr.) Berk.	bolet pomme de pin
<i>Xerocomus pruinatus</i> (Fr.) Quélet	bolet pruineux
<i>Leccinum scabrum</i> (Bull. : Fr.) S.F. Gray	bolet rude
<i>Boletopsis leucomelaena</i> (Pers. : Fr.) Fayod	boletopsis blanc et noir
<i>Bulgaria inquinans</i> (Persoon ex Fries) Fries	bulgarie salissante

Nom Latin	
<i>Calocera viscosa</i> (Pers. : Fr.) Fr.	calocère visqueuse
<i>Calvatia utriformis</i> (Bull. : Pers.) Jaap	calvatie en forme d'outre
<i>Daedalea quercina</i> (L. : Fr.) Pers.	cédalée du chêne
<i>Boletus aereus</i> Bull. : Fr.	cèpe bronzé (tête de nègre)
<i>Boletus edulis</i> Bull. : Fr.	cèpe de Bordeaux
<i>Boletus pinophilus</i> Pilát & Dermek	cèpe des pins
<i>Boletus aestivalis</i> (Paulet) Fr.	cèpe d'été
<i>Cantharellus amethysteus</i> (Quélet) Saccardo	chanterelle améthyste
<i>Cantharellus cibarius</i> Fr. : Fr.	chanterelle comestible, girolle
<i>Craterellus tubaeformis</i> (Bull. : Fr.) Quélet	chanterelle en trompette
<i>Craterellus lutescens</i> (Pers. : Fr.) Fr.	chanterelle jaunissante
<i>Pholiota astragalina</i> (Fr. : Fr.) Singer	chardonneret astragale
<i>Clavicornia pyxidata</i> (Pers. : Fr.) Doty	clavaire à pyxides <u>sommitales</u>
<i>Clavulinopsis fusiformis</i> (Sow. : Fr.) Corner	clavaire en fuseau
<i>Clavariadelphus pistillaris</i> (L. : Fr.) Donk	clavaire en pilon
<i>Clavulina cinerea</i> (Bull. : Fr.) J. Schröter	clavaire grise
<i>Clavariadelphus truncatus</i> (Quélet) Donk	clavaire tronquée
<i>Climacocystis borealis</i> (Fr. : Fr.) Kotlaba & Pouzar	climacocystis boréal
<i>Ampulloclitocybe clavipes</i> (Pers. : Fr.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys	clitocybe à pied en massue
<i>Clitocybe cerussata</i> (Fr. : Fr.) Kummer	clitocybe blanc de céruse
<i>Clitocybe graminicola</i> M. Bon	clitocybe des graminées
<i>Pseudoclitocybe cyathiformis</i> (Bull. : Fr.) Singer	clitocybe en forme de coupe
<i>Clitocybe geotropa</i> (Bull. : Fr.) Quélet	clitocybe geotrope tête de moine
<i>Lepista nebularis</i> (Batsch : Fr.) Harmaja	clitocybe nebuleux (lépiste nébuleux)
<i>Clitocybe odora</i> (Bull. : Fr.) Kummer	clitocybe odorant
<i>Clitopilus prunulus</i> (Scop. : Fr.) Kummer	clitopile petite prune (meunier)
<i>Megacollybia platyphylla</i> (Pers. : Fr.) Kotlaba & Pouzar	col à larges lamelles
<i>Collybia fusipes</i> (Bull. : Fr.) Quélet	collybie à pied en fuseau
<i>Xerula pudens</i> (Pers. : Fr.) Singer	collybie à long pied (à poil ras)
<i>Macrocystidia cucumis</i> (Pers. : Fr.) Jossierand	collybie à odeur de concombre
<i>Collybia erythropus</i> (Pers. : Fr.) Kummer	collybie à pied rouge
<i>Collybia dryophila</i> (Bull. : Fr.) Kummer	collybie amie du chêne
<i>Collybia butyracea</i> (Bull. : Fr.) Kummer	collybie beurrée
<i>Collybia peronata</i> (Bolt. : Fr.) Kummer	collybie guêtrée
<i>Collybia maculata</i> (Alb. & Schw. : Fr.) Kummer	collybie maculée
<i>Xerula radicata</i> (Rehl. : Fr.) Dörfelt	collybie radicante
<i>Coprinus comatus</i> (O.F. Müller : Fr.)	coprin chevelu
<i>Coprinus atramentarius</i> (Bull. : Fr.) Fr.	coprin noir d'encre
<i>Cortinarius malicorius</i> Fr.	cortinaire écorce de grenade
<i>Cortinarius armillatus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	cortinaire à bracelets
<i>Cortinarius bivelus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	cortinaire à deux voiles
<i>Cortinarius pholideus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	cortinaire à fines écailles
<i>Cortinarius infractus</i> (Pers. : Fr.) Fr.	cortinaire à marge infléchie
<i>Cortinarius traganus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	cortinaire à odeur de poire

Nom Latin	
<i>Cortinarius torvus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	cortinaire à pied courbe
<i>Cortinarius glaucopus</i> (J.C. Sch. : Fr.) Fr.	cortinaire à pied glauque
<i>Cortinarius elegantior</i> (Fr.) Fr.	cortinaire assez élégant
<i>Cortinarius calochrous</i> (Pers. : Fr.) Fr.	cortinaire aux belles couleurs
<i>Cortinarius croceocaeruleus</i> (Pers. : Fr.) Fr.	cortinaire azuré et safran
<i>Cortinarius alboviolaceus</i> (Pers. : Fr.) Fr.	cortinaire blanc lilacin
<i>Cortinarius venetus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	cortinaire bleu verdâtre
<i>Cortinarius brunneus</i> (Pers. : Fr.) Fr.	cortinaire brun
<i>Cortinarius camphoratus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	cortinaire camphré
<i>Cortinarius balteatocumatilis</i> R. Henry ex P.D. Orton	cortinaire ceinturé couleur eau de mer
<i>Cortinarius corrosus</i> Fr.	cortinaire cotoneux
<i>Cortinarius claricolor</i> (Fr.) Fr.	cortinaire couleur claire
<i>Cortinarius hinnuleus</i> (Sow.) Fr.	cortinaire couleur de faon
<i>Cortinarius orellanus</i> Fr.	cortinaire couleur de rocou
<i>Cortinarius varicolor</i> (Pers. : Fr.) Fr.	cortinaire de couleurs variées
<i>Cortinarius violaceus</i> var. <i>harcynicus</i> (Pers.) Brandrud	cortinaire de la forêt noire
<i>Cortinarius stillatitius</i> Fr.	cortinaire dégoulinant
<i>Cortinarius delibutus</i> Fr.	cortinaire enduit
<i>Cortinarius herculeus</i> Malençon ex Malençon	cortinaire herculéen
<i>Cortinarius humicola</i> (Quélet) R. Maire	cortinaire humicole
<i>Cortinarius melanotus</i> Kalchbrenner	cortinaire marqué de noir
<i>Cortinarius atrovirens</i> Kalchbrenner	cortinaire noir verdâtre
<i>Cortinarius bolaris</i> (Pers. : Fr.) Fr.	cortinaire orné de squames rouges feu
<i>Cortinarius joguetii</i> Melot	cortinaire parfumé
<i>Cortinarius subpurpurascens</i> (Batsch) Kickx	cortinaire Proche de <i>C.purpurascens</i>
<i>Cortinarius sodagnitus</i> R. Henry	cortinaire reconnu par la soude
<i>Cortinarius praestans</i> (Cordier) Gillet	cortinaire remarquable
<i>Cortinarius cinnabarinus</i> Fr.	cortinaire rouge cinabre
<i>Cortinarius sanguineus</i> (Wulfen : Fr.) S.F. Gray	cortinaire sanguin
<i>Cortinarius triumphans</i> Fr.	cortinaire triomphant
<i>Cortinarius trivialis</i> J.E. Lange ex J.E. Lange	cortinaire trivial
<i>Cortinarius varius</i> (J.C. Sch. : Fr.) Fr.	cortinaire varié
<i>Cortinarius violaceus</i> (L. : Fr.) Fr.	cortinaire violet
<i>Crepidotus mollis</i> (J.C. Sch. : Fr.) Kummer	crépidote mou
<i>Cyathus olla</i> (Batsch : Pers.) Pers.	cyathe marmite
<i>Cyathus striatus</i> (Huds. : Pers.) Willdenow	cyathe strié
<i>Cystoderma amianthinum</i> (Scop.) Fayod	cystoderme amantiacé
<i>cystoderma carcharias</i> (pers.: fr.) Fayod	cystoderme à dents de requin
<i>Suillus grevillei</i> (Klotzsch : Fr.) Singer	dédié à Gréville
<i>Entoloma rhodopolium</i> f. <i>nidorosum</i> (Fr.) Noordeloos	entolome à odeur nitreuse
<i>Marasmius oreades</i> (Bolt. : Fr.) Fr.	faux mousseron, marasme des oréades
<i>Russula cyanoxantha</i> f. <i>peltereau</i> Singer	forme de Peltereau
<i>Galerina marginata</i> (Batsch) Kühner	galère marginée
<i>Ganoderma lipsiense</i> (Batsch) G.F. Atkinson	ganoderme aplati

Nom Latin	
<i>Ganoderma lucidum</i> (W. Curtis : Fr.) P. Karsten	ganoderme luisant
<i>Geastrum sessile</i> (Sow.) Pouzar	geastre sans pied
<i>Gomphidius glutinosus</i> (J.C. Sch. : Fr.) Fr.	gomphide glutineux
<i>Chroogomphus rutilus</i> (J.C. Sch. : Fr.) O.K. Miller	gomphide rutilant
<i>Tremiscus helvelloides</i> (de Candolle : Fr.) Donk	guépinie en forme d'helvelle
<i>Gymnopilus penetrans</i> (Fr. : Fr.) Murrill	gymnopile pénétrant
<i>Gyromitra infula</i> (Schaeffer ex Fries) Quélet	gyromitre en turban
<i>Hebeloma radicosum</i> (Bull. : Fr.) Ricken	hebelome à odeur d'amande amère
<i>Hebeloma laterinum</i> (Batsch) Vesterholt	hebelome belle hélène
<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull. : Fr.) Quélet	hebelome croûte de pain
<i>Hebeloma sinapizans</i> (Paulet ex Fr.) Gillet	hebelome échaudé
<i>Hebeloma theobrominum</i> Quadraccia	hebelome tronqué
<i>Helvella crispa</i> (Scopoli ex Fries) Fries	helvelle crêpue
<i>Helvella elastica</i> Bulliard ex Fries	helvelle élastique
<i>Heterobasidion annosum</i> (Fr. : Fr.) Brefeld	heterobasidion durable
<i>Hydnum rufescens</i> Pers. : Fr.	hydne roussissant
<i>Hydnum repandum</i> L. : Fr.	hydne sinué, pied de mouton
<i>Hygrophorus agathosmus</i> (Fr.) Fr.	hygrophore à bonne odeur
<i>Hygrophorus chrysodon</i> (Batsch : Fr.) Fr.	hygrophore à dents d'or
<i>Hygrophorus hyacinthinus</i> Quélet	hygrophore à odeur de jacinthe
<i>Hygrophorus eburneus</i> (Bull. : Fr.) Fr.	hygrophore blanc d'ivoire
<i>Hygrocybe calciphila</i> Arnolds	hygrophore calcicole
<i>Cuphophyllus cereopallidus</i> (Cléménçon) M. Bon	hygrophore couleur de cire pâle
<i>Cuphophyllus berkeleyi</i> (P.D. Orton & Watling) M. Bon	hygrophore de Berkeley
<i>Hygrocybe konradii</i> Haller	hygrophore de Konrad
<i>Hygrophorus nemoreus</i> (Pers. : Fr.) Fr.	hygrophore des bois
<i>Hygrophorus capreolarius</i> (Kalchbrenner) Fr.	hygrophore des chevreuils
<i>Hygrophorus lucorum</i> Kalchbrenner	hygrophore des mélèzes
<i>Hygrophorus poetarum</i> Heim	hygrophore des poètes
<i>Cuphophyllus pratensis</i> (Pers. : Fr.) M. Bon	hygrophore des prés
<i>Hygrophorus discoideus</i> (Pers. : Fr.) Fr.	hygrophore discoïde
<i>Hygrophorus discoxanthus</i> (Fr.) Rea	hygrophore jaune au disque
<i>Hygrocybe quieta</i> (Kühner) Singer	hygrophore odeur de lactarius quietus (tranquille)
<i>Hygrophorus pudorinus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	hygrophore pudibond
<i>Hygrophorus pustulatus</i> (Pers. : Fr.) Fr.	hygrophore pustuleux
<i>Hygrocybe punicea</i> (Fr. : Fr.) Kummer	hygrophore rouge ponceau
<i>Hygrophorus erubescens</i> (Fr. : Fr.) Fr.	hygrophore rougissant
<i>Hygrophorus russula</i> (J.C. Sch. : Fr.) Quélet	hygrophore russule
<i>Hypholoma capnoides</i> (Fr. : Fr.) Kummer	hypholome à lames enfumées (doux)
<i>Hypholoma lateritium</i> (J.C. Sch. : Fr.) Kummer	hypholome couleur de brique
<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds. : Fr.) Kummer	hypholome en touffe
<i>Hypholoma epixanthum</i> var. <i>radicosum</i> (J.E. Lange) M. Bon & Roux	hypholome radicaux
<i>Inocybe geophylla</i> (Sow. : Fr.) Kummer	Inocybe à lames terreuses
<i>Inocybe corydalina</i> Quélet	Inocybe à odeur de corydale

Nom Latin	
<i>Inocybe cervicolor</i> (Pers.) Quélet	Inocybe couleur de cerf
<i>Inocybe pudica</i> Kühner	Inocybe pudique
<i>Inocybe piriadora</i> (Pers. : Fr.) Kummer	Inocybe trompeur (odeur de poire)
<i>Inocybe geophylla</i> var. <i>lilacina</i> (Peck) Gillet	Inocybe var. lilacine
<i>Laccaria amethystina</i> (Hudson ? Kummer) Cooke	lacc amethyste
<i>Laccaria laccata</i> (Scop. : Fr.) Cooke	laccaire laqué
<i>Lactarius volemus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	lactaire à lait abondant (vachotte)
<i>Lactarius pyrogalus</i> (Bull. : Fr.) Fr.	lactaire à lait brûlant
<i>Lactarius chrysorrhoeus</i> Fr.	lactaire à lait jaune d'or
<i>Lactarius serifluus</i> (de Candolle : Fr.) Fr.	lactaire à lait séreux
<i>Lactarius camphoratus</i> (Bull. : Fr.) Fr.	lactaire à odeur de chicorée
<i>Lactarius glycosmus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	lactaire à odeur de noix de coco
<i>Lactarius torminosus</i> (J.C. Sch. : Fr.) Pers.	lactaire à toison
<i>Lactarius badiusanguineus</i> Kühner & Romagnesi	lactaire bai rouge sombre
<i>Lactarius fluens</i> Boudier	lactaire coulant
<i>Lactarius picinus</i> Fr.	lactaire couleur de poix
<i>Lactarius salmonicolor</i> Heim & Leclair	lactaire couleur de saumon
<i>Lactarius deliciosus</i> (L. : Fr.) S.F. Gray	lactaire délicieux
<i>Lactarius tabidus</i> Fr.	lactaire déperissant
<i>Lactarius controversus</i> Pers. : Fr.	lactaire des peupliers
<i>Lactarius deterrimus</i> Gröger	lactaire détestable
<i>Lactarius vietus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	lactaire fané
<i>Lactarius aurantiofulvus</i> Blum ex M. Bon	lactaire Fauve orangé
<i>Lactarius fuliginosus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	lactaire fuligineux
<i>Lactarius uvidus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	lactaire humide
<i>Lactarius intermedius</i> (Fr. ?) Cooke	lactaire intermédiaire
<i>Lactarius blennius</i> (Fr. : Fr.) Fr.	lactaire muqueux
<i>Lactarius pallidus</i> Pers. : Fr.	lactaire pâle
<i>Lactarius albocarneus</i> Britzelmayer	lactaire pâle glutineux
<i>Lactarius pergamenus</i> (Swartz : Fr.) Fr.	lactaire parcheminé
<i>Lactarius necator</i> (Bull. : Fr.) Pers.	lactaire plombé
<i>Lactarius pubescens</i> (Schrad. ?) Fr.	lactaire pubescent
<i>Lactarius scrobiculatus</i> (Scop. : Fr.) Fr.	lactaire scrobiculé
<i>Lactarius britannicus</i> f. <i>pseudofulvissimus</i> (M. Bon) M. T. Basso	lactaire soyeux(forme) faux fulvissimus
<i>Lactarius quietus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	lactaire tranquille
<i>Lactarius vellereus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	lactaire velouté
<i>Lactarius quieticolor</i> Romagnesi	lactaire à couleur de <i>L. quietus</i>
<i>Fistulina hepatica</i> (J.C. Sch. : Fr.) Withering	langue de bœuf
<i>Gloeophyllum abietinum</i> (Bull. : Fr.) P. Karsten	lenzite du sapin
<i>Daedaleopsis tricolor</i> (Bull. : Fr.) Bondarzew & Singer	lenzite tricolore
<i>Lepiota ignivolvata</i> Bousset & Jossierand	lépiote à base rouge
<i>Lepista irina</i> (Fr.) Bigelow	lépiote à odeur d'iris
<i>Lepiota ventriosospora</i> D.A. Reid	lépiote à spores ventruées
<i>Echinoderma asperum</i> (Pers. : Fr.) M. Bon	lépiote âpre

Nom Latin	
<i>Lepista glaucocana</i> (Bresadola) Singer	lépiote blanchâtre
<i>Lepiota cristata</i> (Bolt. : Fr.) Kummer	Lépiote crêtée
<i>Macrolepiota procera</i> (Scop. : Fr.) Singer	lépiote élevée, Coulemelle
<i>Lepiota clypeolaria</i> (Bull. : Fr.) Kummer	lépiote en bouclier
<i>Macrolepiota excoriata</i> (J.C. Sch. : Fr.) Moser ex Wasser	lépiote excoriée
<i>Macrolepiota rickenii</i> (Velenovsky) Bellù & Lanzoni	lépiote gracile
<i>Lepista inversa</i> (Scop. : Fr.) Patouillard	lépiote inversée
<i>Macrolepiota mastoidea</i> (Fr. : Fr.) Singer	lépiote mamelonnée
<i>Lepiota sublaevigata</i> M.Bon & Boiffard	lépiote presque lisse
<i>Lepista sordida</i> (Schum. : Fr.) Singer	lepiste sordide
<i>Leucopaxillus giganteus</i> (Leysser : Fr.) Singer	leucopaxille géant
<i>Limacella guttata</i> (Pers. : Fr.) Konrad & Maublanc	limacelle tachée
<i>Lycogala epidendrum</i> (Linneaus) Fries	lycogale lignicole
<i>Lyophyllum semitale</i> (Fr. : Fr.) Kühner ex Kalamees	lyophille salissant, des sentiers
<i>Lyophyllum decastes</i> (Fr. : Fr.) Singer	lyophille agrégé
<i>Lyophyllum connatum</i> (Schum. : Fr.) Singer	lyophille conné
<i>Lyophyllum fumosum</i> (Pers. : Fr.) Kühner & Romagnesi ex P.D. Orton	lyophille enfumé
<i>Melanoleuca grammopodia</i> (Bull. : Fr.) Patouillard	méla, oleuca à pied strié
<i>Phlebia tremellosa</i> (Schrad. : Fr.) K.K. Nakasone & H.H. Burdsall	mérule tremblant
<i>Mycena pelianthina</i> (Fr. : Fr.) Quélet	mycène à lames bordées de violet
<i>Mycena polygramma</i> (Bull. : Fr.) S.F. Gray	mycène à pied strié
<i>Mycena epipterygia</i> (Scop. : Fr.) S.F. Gray	mycène des fougères
<i>Mycena inclinata</i> (Fr.) Quélet	mycène inclinée
<i>Mycena pura</i> (Pers. : Fr.) Kummer	mycène pure
<i>Mycena rosea</i> (Bull. ? Pers.) Gramberg	mycène rose
<i>Mycena viscosa</i> R. Maire	mycène visqueuse
<i>Chrysomphalina chrysophylla</i> (Fr. : Fr.) Cléménçon	omphale à lames jaunes
<i>Otidea onotica</i> (Persoon ex Fries) Fuckel	oreille d'âne ou de lièvre
<i>Panellus stipticus</i> (Bull. : Fr.) P. Karsten	panella stryptique
<i>Paxillus involutus</i> (Batsch : Fr.) Fr.	pax enroulé
<i>Tapinella atrotomentosa</i> (Batsch : Fr.) Šutara	paxille à pied noir
<i>Paxillus rubicundulus</i> P.D. Orton	paxille rubicond
<i>Sowerbyella imperialis</i> (Peck) Korf, non (Beck)	pézize impériale
<i>Aleuria aurantia</i> (Persoon ex Fries) Fuckel	pézize orangée
<i>Chlorociboria aeruginascens</i> (Nylander) Kanouse	pézize turquoise
<i>Phellodon melaleucus</i> (Swartz : Fr.) P. Karsten	phellodon blanc et noir
<i>Phellodon confluens</i> (Pers.) Pouzar	phellodon confluent
<i>Phellodon niger</i> (Fr. : Fr.) P. Karsten	phellodon noir
<i>Phellodon tomentosus</i> (L. : Fr.) Banker	phellodon tomenteux
<i>Pholiota alnicola</i> (Fr. : Fr.) Singer	pholiote de l'aulne
<i>Phaeolepiota aurea</i> (Bull. : Fr.) R. Maire ex Konrad & Maublanc	pholiote dorée
<i>Agrocybe cylindracea</i> (de Candolle : Fr.) R. Maire	pholiote du peuplier
<i>Pholiota squarrosa</i> (Oeder : Fr.) Kummer	pholiote écailleuse
<i>Pholiota flammans</i> (Batsch : Fr.) Kummer	pholiote flamboyante
<i>Pholiota gummosa</i> (Lasch : Fr.) Singer	pholiote gommeuse
<i>Rozites caperatus</i> (Pers. : Fr.) P. Karsten	pholiote ridée
<i>Pholiota lenta</i> (Pers. : Fr.) Singer	pholiote visqueuse
<i>Lepista nuda</i> (Bull. : Fr.) Cooke	pied bleu (lépiste nue)
<i>Phyllotopsis nidulans</i> (Pers. : Fr.) Singer	pleurote en forme de nid

Nom Latin	
<i>Pleurotus ostreatus</i> (Jacq. : Fr.) Kummer	pleurote en forme d'huître
<i>Pleurotus dryinus</i> (Pers. : Fr.) Kummer	pleurote voilée
<i>Pluteus cervinus</i> (J.C. Sch. ?) Kummer	plutée couleur de cerf
<i>Ischnoderma benzoinum</i> (Wahlenberg : Fr.) P. Karsten	polypore à odeur de Benjoin
<i>Postia caesia</i> (Schrad. : Fr.) P. Karsten	polypore bleuâtre
<i>Scutiger confluens</i> (Alb. & Schw. : Fr.) Bondarzew & Singer	polypore confluent
<i>Scutiger cristatus</i> (J.C. Sch. : Fr.) Bondarzew & Singer	polypore crêté
<i>Scutiger ovinus</i> (J.C. Sch. : Fr.) Murrill	polypore des brebis
<i>Piptoporus betulinus</i> (Bull. : Fr.) P. Karsten	polypore du bouleau
<i>Grifola frondosa</i> (Dicks. : Fr.) S.F. Gray	polypore feuillé, poule des bois
<i>Fomitopsis pinicola</i> (Swartz : Fr.) P. Karsten	polypore marginé
<i>Psathyrella candolleana</i> (Fr. : Fr.) R. Maire	psathyrelle de De Candolle
<i>Psathyrella piluliformis</i> (Bull.) P.D. Orton	psathyrelle hydrophile
<i>Lacrymaria lacrymabunda</i> (Bull. : Fr.) Patouillard	psathyrelle veloutée
<i>Pycnoporus cinnabarinus</i> (Jacq. : Fr.) P. Karsten	pycnopore rouge cinabre
<i>Ramaria largentii</i> Marr & Stuntz	ramaire de Largent
<i>Ramaria aurea</i> (J.C. Sch.) Quélet	ramaire dorée
<i>Ramaria formosa</i> (Pers. : Fr.) Quélet	ramaire élégante
<i>Rhizopogon roseolus</i> (Corda) Th. M. Fries	rhizopogon rosâtre
<i>Rhodocybe nitellina</i> (Fr.) Singer	rhodocybe cuivré
<i>Russula mustelina</i> Fr.	Rus. Couleur de belette
<i>Russula integra</i> (L. : Fr.) R. Maire	Rus.entière
<i>Russula nigricans</i> (Bull. ?) Fr.	Rus.noircissante
<i>Russula delica</i> Fr.	russule faux-lactaire (sans lait)
<i>Russula acrifolia</i> Romagnesi ex Romagnesi	russule à feuillets âcres
<i>Russula heterophylla</i> (Fr. : Fr.) Fr.	russule à lames fourchues
<i>Russula densifolia</i> Gillet	russule à lames serrées
<i>Russula cavipes</i> Britzelmayr	russule à pied creux
<i>Russula anthracina</i> Romagnesi	russule anthracite
<i>Russula aurora</i> Krombholz	russule aurore
<i>Russula albonigra</i> (Krombholz) Fr.	russule blanche et noire
<i>Russula amoenicolor</i> Romagnesi ex Romagnesi	russule couleur rus. amoena
<i>Russula fellea</i> (Fr. : Fr.) Fr.	russule de fiel
<i>Russula langei</i> M. Bon	russule dédiée à Lange
<i>Russula queletii</i> Fr.	russule dédiée à Quelet
<i>Russula fageticola</i> (Melz.) Lund	russule du hêtre
<i>Russula fageticola</i> var. <i>strenua</i> Carteret & P. Moëgne-Loccoz	russule du hêtre
<i>Russula firmula</i> J. Schäffer	russule ferme
<i>Russula xerampelina</i> (J.C. Sch.) Fr.	russule feuille morte (écrevisse)
<i>Russula fragilis</i> (Pers. : Fr.) Fr.	russule fragile
<i>Russula grisea</i> (Pers.?) Fr.	russule grise
<i>Russula nobilis</i> Velenovsky	russule noble
<i>Russula ochroleuca</i> Pers.	russule ocre et blanche
<i>Russula exalbicans</i> (Pers.) Melzer & Zvara	russule palissante
<i>Russula subfoetens</i> W.G. Smith	russule proche de R.foetens

Nom Latin	
<i>Russula fuscorubra</i> (Bresadola) Blum	russule rouge sombre
<i>Russula sanguinaria</i> (Bull. => Schum.) S. Rauschert	russule sanguine
<i>Russula chloroides</i> (Krombholz) Bresadola	russule verdâtre
<i>Russula viscida</i> Kudrna	russule visqueuse
<i>Russula cyanoxantha</i> (J.C. Sch.) Fr.	russule charbonnière
<i>Russula vesca</i> Fr.	russule comestible
<i>Sarcodon imbricatum</i> (L. : Fr.) P. Karsten	sarc.(Hydne) imbriqué
<i>Scleroderma bovista</i> Fr.	scleroderme boviste
<i>Scleroderma citrinum</i> Pers. : Pers.	scléroderme citrin
<i>Stropharia caerulea</i> Kreisel	strophaire bleu
<i>Stropharia aeruginosa</i> (Curt. : Fr.) Quélet	strophaire vert de gris
<i>Thelephora palmata</i> (Scop. : Fr.) Fr.	telephore palmée
<i>Tephrocybe boudieri</i> (Kühner & Romagnesi) Derbsch	tephrocybe de Boudier
<i>Trametes gibbosa</i> (Pers. : Fr.) Fr.	tramète bossue
<i>Trametes hirsuta</i> (Wulfen : Fr.) Pilát	tramète hirsute
<i>Daedaleopsis confragosa</i> (Bolt. : Fr.) J. Schröter	tramète rude
<i>Trametes versicolor</i> (L. : Fr.) Lloyd	tramète versicolore
<i>Pseudohydnum gelatinosum</i> (Scop. : Fr.) P. Karsten	tremellodon gélatineux
<i>Tricholoma atrosquamosum</i> (Chevallier ?) Saccardo	tricholome à écailles noires
<i>Tricholoma orirubens</i> Quélet	tricholome à marge rouge
<i>Tricholoma saponaceum</i> (Fr. : Fr.) Kummer	tricholome à odeur de savon
<i>Tricholoma saponaceum</i> var. <i>squamosum</i> (Cooke) Rea	tricholome à odeur de savon var. écailleuse
<i>Tricholoma saponaceum</i> var. <i>napipes</i> (Krombholz) Barla	tricholome à odeur de savon var. forme de navet
<i>Tricholoma psammopus</i> (Kalchbrenner) Quélet	tricholome à pied sablé
<i>Tricholoma album</i> (J.C. Sch. : Fr.) Kummer	tricholome blanc
<i>Tricholoma columbetta</i> (Fr. : Fr.) Kummer	tricholome colombette
<i>Tricholoma vaccinum</i> (J.C. Sch. : Fr.) Kummer	tricholome couleur de vache
<i>Tricholoma bufonium</i> (Pers. : Fr.) Gillet	tricholome crapeau
<i>Tricholomopsis decora</i> (Fr. : Fr.) Singer	tricholome décoré
<i>Tricholoma equestre</i> (L. : Fr.) Kummer	tricholome des chevaliers
<i>Tricholoma inamoenum</i> (Fr. : Fr.) Gillet	tricholome désagréable
<i>Tricholoma sejunctum</i> (Sow. : Fr.) Quélet	tricholome disjoint
<i>Tricholoma sejunctum</i> var. <i>coniferarum</i> M. Bon	tricholome disjoint var. des conifères
<i>Tricholoma auratum</i> (L. : Fr.) Gillet	tricholome doré
<i>Tricholoma fulvum</i> (Retz. : Fr.) Costantin & Dufour	tricholome fauve
<i>Tricholoma stiparophyllum</i> (Lund) P. Karsten	tricholome faux album
<i>Tricholoma pseudonictitans</i> M. Bon	tricholome faux nictitans
<i>Tricholoma sciodes</i> (Pers.) C. Martin	tricholome gris sombre
<i>Tricholoma myomyces</i> (Pers. : Fr.) J.E. Lange	tricholome gris-souris
<i>Tricholoma imbricatum</i> var. <i>fusipes</i> (Kosina) M. Bon	tricholome imbriqué var. à pied en fuseau
<i>Tricholoma luridum</i> (J.C. Sch. : Fr.) Kummer	tricholome jaune blafard
<i>Tricholoma sulfurescens</i> Bresadola	tricholome jaunissant
<i>Tricholoma aurantium</i> (J.C. Sch. : Fr.) Ricken	tricholome orangé
<i>Tricholoma portentosum</i> (Fr. : Fr.) Quélet	tricholome prétentieux

Nom Latin	
<i>Tricholoma ustaloides</i> Romagnesi ex Romagnesi	tricholome proche de tri ustale
<i>Tricholomopsis rutilans</i> (J.C. Sch. : Fr.) Singer	tricholome rutilant
<i>Tricholoma sulphureum</i> (Bull. : Fr.) Kummer	tricholome soufré
<i>Tricholoma terreum</i> (J.C. Sch. : Fr.) Kummer	tricholome terreux (petit gris)
<i>Tricholoma pardinum</i> (Pers.) Quélet	tricholome tigré
<i>Tricholoma virgatum</i> (Fr. : Fr.) Kummer	tricholome vergeté
<i>Tricholoma saponaceum</i> f. <i>ardosiacum</i> (Bresadola) M. Bon	tricholome à odeur de savon var. forme ardoisée
<i>Tricholoma batschii</i> G. Gulden ex M. Christensen & Noordeloos	tricholome rompu ou de Batsch
<i>Tricholoma scalpturatum</i> (Fr.) Quélet	tricholome sculpté ou jaunissant
<i>Craterellus cornucopioides</i> (L. : Fr.) Pers.	trompette des morts
<i>Tuber uncinatum</i> Chatin	truffe de Bourgogne
<i>Tuber mesentericum</i> Vittadini	truffe de Lorraine
<i>Russula chloroides</i> var. <i>trachyspora</i> (Romagnesi) Sarnari	var. à spores fortement épineuses
<i>Lycoperdon umbrinum</i> Pers. : Pers.	Vesse de loup brun d'ombre
<i>Morganella piriformis</i> (J.C. Sch. : Pers.) Kreisel & Krüger	vesse de loup en poire
<i>Lycoperdon echinatum</i> Pers. : Pers.	vesse de loup hérissée
<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers. : Pers.	vesse de loup perlée
<i>Xylaria longipes</i> (Nitschke) Dennis	xylaire à long pied
<i>Xylaria polymorpha</i> (Persoon ex Fries) Greville	xylaire polymorphe
Nom latin	
<i>Agaricus xanthoderma</i> var. <i>griseus</i> (A. Pearson) M. Bon & Cappelli	
<i>Albatrellus citrinus</i> Ryman	
<i>Bisporella citrina</i> (Batsch ex Fries) Korf & Carp.	
<i>Clitocybe candicans</i> (Pers. : Fr.) Kummer	
<i>Cortinarius balteatus</i> (Fr.) Fr.	
<i>Cortinarius eucaerulescens</i> R. Henry ex R. Henry	
<i>Cortinarius malachus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	
<i>Cortinarius multiformis</i> (Fr. ?) Fr.	
<i>Cystoderma amianthinum</i> f. <i>rugosoreticulatum</i> (Lorinser) A.H. Smith & Singer	
<i>Hygrocybe calyptriformis</i> (Berk.) Fayod	
<i>Hygrocybe fornicata</i> (Fr.) Singer	
<i>Pholiota limonella</i> (Peck) Saccardo	
<i>Plicaturopsis crispa</i> (Pers. : Fr.) D.A. Reid	
<i>Rhodocybe popinalis</i> (Fr. : Fr.) Singer	