

MYCOLOGIE DANS LA VALLÉE DES HUILES : LES AMANITES BRUNES SONT DE SORTIE

COMPTE RENDU DE LA SORTIE DU JEUDI 9 JUILLET 2020

Par Philippe Saviuc

Nous nous rendons régulièrement dans cette vallée bien connue des mycologues (et des ramasseurs de champignons). La gageure qui nous est proposée est de trouver quelques espèces alors que nous sommes début juillet et qu'il fait très sec depuis de nombreux jours. En effet, nous sommes quelque peu des « nécessiteux » : c'est notre première sortie mycologique 'société' après le confinement printanier.

Notre cible est une zone humide dans les contreforts nord de la chaîne des Hurtières, à proximité du col du Grand Cucheron. Trop haut ! Trop sec ! Les prédictions de quelques-uns d'entre-nous sont réalisées : il n'y a que peu d'espèces. Nos botanistes ont toutefois identifié dans l'herbe grasse du bord de chemin *Campanula barbata*, dont la présence a surpris : cette campanule paraît plutôt présente dans des milieux plus rocailleux et secs.

Nous nous sommes réfugiés sur un plan B qui va s'avérer plus satisfaisant, au-dessus de Bourget-en-Huile. Ces deux stations nous ont toutefois permis de rassembler, d'observer et de séparer quatre amanites brunes dont le risque de confusion est classique : *Amanita rubescens*, *Amanita pantherina*, *Amanita excelsa* variété *spissa* et *Amanita excelsa*. S'il y a un seul critère à retenir, c'est la recherche de stries sur le dessus de l'anneau et sur la partie du pied comprise entre l'anneau et les lames : la présence de ces stries élimine la toxique *Amanita pantherina*.



Présence de stries ici bien marquées sur le dessus de l'anneau et sur la partie du pied comprise entre anneau et lames. Généralement moins marquées, les stries peuvent demander de recourir à une loupe x10 pour être visualisées.



Absence de stries : *Amanita pantherina*. L'absence de stries est à confirmer à l'aide d'une loupe x10.

LISTE DES CHAMPIGNONS OBSERVÉS ¹ (d'après les notes de Philippe Saviuc).

Commune : Bourget-en-Huile

Lieu-dit : Le Planet

Altitude : 1470 à 1520 m

Coordonnées (degrés décimaux) : latitude 45,4736 N ; longitude 6,2269 E

Amanita excelsa (Fr. : Fr.) Bertillon
Amanita pantherina (DC. : Fr.) Krombh.
Amanita excelsa var. *spissa* (Fr.) Neville & Poumarat
Amanita umbrinolutea (Secrétan ex Gillet) Bataille
Neoboletus erythropus (Pers.) C. Hahn
Calocera viscosa (Pers. : Fr.) Fr.

Cortinarius multififormis Fr. (groupe)
Fomitopsis pinicola (Sw. : Fr.) P. Karst.
Marasmius rotula (Scop. : Fr.) Fr.
Rozites caperatus (Pers. : Fr.) P. Karst.
Tricholomopsis rutilans (Schaeff. : Fr.) Singer

Commune : Bourget-en-Huile
Lieu-dit : Le Champenet
Altitude : 920 à 960 m
Coordonnées GPS : latitude N 45,4823 – longitude E 6,2158

<i>Amanita junquillea</i> Quél.	<i>Kuehneromyces mutabilis</i> (Schaeff.) Singer & A.H.Sm.
<i>Amanita rubescens</i> (Pers. : Fr.) Pers.	<i>Lactarius deterrimus</i> Gröger
<i>Boletus aestivalis</i> (Paulet) Fr.	<i>Lactarius piperatus</i> (L. : Fr.) Pers.
<i>Caloboletus calopus</i> (Pers.) Vizzini	<i>Macrolepiota procera</i> (Scop. : Fr.) Singer
<i>Suillellus luridus</i> (Schaeff.) Murrill	<i>Megacollybia platyphylla</i> (Pers. : Fr.) Kotl. & Pouzar
<i>Calocera viscosa</i> (Pers. : Fr.) Fr.	<i>Mycena galericulata</i> (Scop. : Fr.) Gray
<i>Cantharellus subpruinosis</i> Eyssartier & Buyck (groupe)	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch : Fr.) Fr. (groupe)
<i>Chlorociboria aeruginascens</i> (Nyl.) Kanouse ex C.S.Ramamurthi, Korf & L.R.Batra	<i>Phaeocollybia lugubris</i> (Fr. : Fr.) Heim
<i>Entoloma lividum</i> (Bull. ?) Quél.	<i>Pholiota flammans</i> (Batsch : Fr.) Kumm.
<i>Fomitopsis pinicola</i> (Sw. : Fr.) P.Karst.	<i>Polyporus picipes</i> (Cooke) G.Cunn.
<i>Gloeophyllum odoratum</i> (Wulfen : Fr.) Imazeki	<i>Porphyrellus porphyrosporus</i> (Fr.) E.-J. Gilbert
<i>Hydnum repandum</i> L. : Fr.	<i>Russula aurea</i> Pers.
<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds. : Fr.) P.Kumm.	<i>Russula cyanoxantha</i> (Schaeff.) Fr.
	<i>Tylopilus felleus</i> (Bull. : Fr.) P.Karst



¹ La nomenclature suit le référentiel taxonomique TAXREF v14.