

RETOUR MYCOLOGIQUE AU COL DE PLAINPALAIS

COMPTE RENDU DE LA SORTIE DU SAMEDI 24 OCTOBRE 2020

Par Philippe Saviuc

La sortie inscrite au programme d'activité 2020 de la SMBRC était initialement prévue à Seyssel. Notre guide pour cette sortie venait de connaître un souci de santé qui le handicapait dans ses déplacements. Nous nous sommes donc retrouvés sur le parking de rendez-vous avec l'interrogation suivante : où aller ?

Nous étions dans un moment charnière de la saison avec la réapparition de la pluie ces dernières semaines mais pas suffisamment pour revivifier nos stations de basse altitude habituelles pour la saison, stations durement malmenées pendant plusieurs mois de temps sec et venté. Alors, la forêt de Corsuet ? L'avant pays savoyard ? Trop tôt et terrain trop sec pour la première station, trop éloignée pour la seconde alors que le ciel gris était menaçant. Nous optons pour le col de Plainpalais qui cumule plusieurs avantages : son altitude (environ 1200 mètres), le fait que la société n'a pas arpenté ce lieu depuis plusieurs années, et aussi parce que ce secteur a été visité (avec succès) par l'un d'entre nous la semaine précédente.

Nous étions sept à accéder au col de Plainpalais dont deux nouveaux adhérents, et nous avons constitué deux groupes. Plusieurs milieux nous sont proposés, un boisement de conifères, mélange de sapins et d'épicéas avec quelques feuillus, principalement du hêtre, une hêtraie quasi pure, une prairie non pâturée dans son intégralité en bordure ouest de ces boisements, quelques pins et mélèzes plantés en limite de chemins ou de voies de circulation.

La prospection de tous ces milieux, entrecoupée par le partage de notre repas de midi, a été agrémentée par l'apparition du soleil à la mi-journée. Les champignons n'étaient pas très nombreux, les espèces étant souvent représentées par un nombre très réduit de spécimens, voire trouvées à l'unité. Toutefois 130 récoltes ont aidé à rassembler 113 espèces, le groupe de champignons le plus représenté appartenant au genre *Lactarius* ce qui est habituel à partir du mois de juillet, et par les genres *Tricholoma* et *Hygrophorus*, plus coutumiers de la fin de saison. Nous avons pu admirer le chatoiement de couleurs d'espèces peu fréquemment vues sur le terrain comme le rouge vineux de *Hygrophorus capreolarius*, le bleu indéfinissable en particulier de la base du pied de l'esthétique *Mycena cyanorrhiza*, sans oublier notre « arlequin des prairies maigres » *Hygrocybe psittacina* (son nom vernaculaire est l'hygrophore perroquet). Et pour illustrer la rapide évolution du cortège fongique d'une semaine à l'autre, osons cette comparaison sommaire : si beaucoup plus d'espèces ont été recensées sans surprise par plus de mycologues prospectant sur une plus longue durée ce samedi 29 octobre, en revanche une vingtaine d'autres espèces avaient été trouvées par un unique récolteur sept jours auparavant. En particulier, et puisqu'il est question de couleur chatoyante, la très belle *Chrysomphalina grossula*, recherchée et malheureusement non retrouvée ce 29 octobre, qui prend une couleur vert fluo en séchant.

Satisfaits de la variété des espèces rencontrées et de la météo qui s'est avérée favorable, nous avons mis un terme à cette journée.

En l'absence de notre déterminateur et photographe attitré, notons le faible nombre de « petites espèces » déterminées et le fait que les photographies ne sont pas du jour.



Hygrophorus capreolarius
Photo Maurice Durand

Mycena cyanorrhiza
Photo Philippe Saviuc



Hygrocybe psittacina
Photo Jean-Marc Moingeon
www.pharmanatur.com
Avec la permission de l'auteur



Chrysomphalina grossula
Photo Maurice Durand



LISTE DES CHAMPIGNONS OBSERVÉS ¹

(d'après les notes de Thierry Delahaye et Philippe Saviuc).

Commune : Les Déserts

Lieu-dit 1 : Col de Plainpalais

Lieu-dit 2 : Les Feuillères

Altitude : 1202 m

Coordonnées (degrés décimaux) : latitude 45,6466 N ; longitude 6,0242 E

Amanita muscaria (L. : Fr.) Lamarck
Bisporella citrina (Batsch : Fr.) Korf & S.E.Carp.
Calocera viscosa (Pers. : Fr.) Fr.
Clavariadelphus truncatus (Quél.) Donk
Clavulina rugosa (Bull. : Fr.) J.Schröt.
Clitopilus prunulus (Scop. : Fr.) P.Kumm.

Collybia butyracea (Bull. : Fr.) Kumm.
Collybia erythropus (Pers. : Fr.) Kumm.
Collybia peronata (Bolt. : Fr.) Kumm.
Coprinus atramentarius (Bull. : Fr.) Fr.
Coprinus micaceus (Bull. : Fr.) Fr.
Cortinarius glaucopus (Schaeff. : Fr.) Fr.

Cortinarius malicorius Fr.
Cortinarius odorifer Britzelm.
Cortinarius salor Fr.
Cortinarius traganus (Fr. : Fr.) Fr.
Cortinarius venetus (Fr.) Fr.
Entoloma rhodopolium f. *nidosum* (Fr.) Noordel.
Fomitopsis pinicola (Sw. : Fr.) P.Karst.
Geastrum quadrifidum Pers. : Pers.
Gymnopilus penetrans (Fr. : Fr.) Murrill
Collybia fusipes (Bull.) Quél.
Hebeloma radicosum (Bull. : Fr.) Ricken
Hebeloma sinapizans (Paulet ex Fr.) Gillet
Hydnum repandum L. : Fr.
Hygrocybe psittacina (Schaeff. : Fr.) Kumm.
Hygrophorus agathosmus (Fr.) Fr.
Hygrophorus chrysodon (Batsch : Fr.) Fr.
Hygrophorus discoxanthus (Fr.) Rea
Hygrophorus eburneus (Bull. : Fr.) Fr.
Hygrophorus lindtneri var. *carpini* (Gröger) Bon
Hygrophorus pudorinus (Fr. : Fr.) Fr.
Hygrophorus russula (Schaeff. : Fr.) Quél.
Hypholoma capnoides (Fr. : Fr.) Kumm.
Hypholoma fasciculare (Huds. : Fr.) P.Kumm.
Hypomyces lateritius (Fr. : Fr.) Tul. & C.Tul.
Inocybe cervicolor (Pers.) Quél.
Laccaria affinis (Singer) Bon
Laccaria amethystina (Huds. ? Kumm.) Cooke
Lactarius badiosanguineus Kühner & Romagn.
Lactarius blennius (Fr.) Fr.
Lactarius britannicus f. *pseudofulvissimus* (Bon) Basso
Lactarius deterrimus Gröger
Lactarius intermedius (Fr. ?) Cooke
Lactarius pallidus Pers. : Fr.
Lactarius salmonicolor Heim & Leclair
Lactarius scrobiculatus (Scop. : Fr.) Fr.
Lactarius turpis (Weinm.) Fr.
Lentinellus micheneri (Berk. & M.A.Curtis) Pegler

Lepista nebularis (Batsch : Fr.) Harmaja
Lycoperdon perlatum Pers.
Morganella pyriformis (Schaeff. : Pers.) Kreisel & D.Krüger
Macrolepiota mastoidea (Fr. : Fr.) Singer
Marasmiellus perforans (Hoffm. : Fr.) Antonín, Halling & Noordel.

Marasmius alliaceus (Jacq. : Fr.) Fr.
Marasmius epiphyllus (Pers. : Fr.) Fr.
Mycena cyanorrhiza Quél.
Mycena epipterygia (Scop. : Fr.) Gray
Mycena pelianthina (Fr. : Fr.) Quél.
Mycena pura (Pers. : Fr.) Kumm.
Mycena rosea (Bull. ? Pers.) Gramberg
Ombrophila pura (Pers. : Fr.) Baral
Oudemansiella mucida (Schrad. : Fr.) Höhn.
Pholiotina arrhenii (Fr.) Singer
Pseudoclitocybe cyathiformis (Bull. : Fr.) Singer
Pseudohydnum gelatinosum (Scop. : Fr.) P.Karst.
Rhytisma acerinum (Pers.) Fr.
Roridomyces roridus (Scop. : Fr.) Rexer
Russula cavipes Britzelm.
Russula fageticola Melzer ex S.Lundell
Russula integra (L. : Fr.) Maire
Russula mustelina Fr.
Russula queletii Fr.
Stropharia caerulea Kreisel
Tephrocybe rancida (Fr. : Fr.) Donk
Trametes versicolor (L.) Lloyd
Tremiscus helvelloides (DC. : Fr.) Donk
Tricholoma boudieri (Barla) Barla
Tricholoma orirubens Quél.
Tricholoma scalpturatum (Fr.) Quél.
Tricholoma sulphureum (Bull. : Fr.) Kumm.
Tricholoma vaccinum (Schaeff. : Fr.) Kumm.
Tricholomopsis decora (Fr.) Singer
Xylaria hypoxylon (L. : Fr.) Grev.
Xylaria longipes (Nitschke) Dennis

Commune : Le Noyer

Lieu-dit : Le Creux du loup

Altitude : 1193 m

Coordonnées (degrés décimaux) : latitude 45,6525 N ; longitude 6,0213 E

Agaricus campestris L.
Amanita muscaria (L. : Fr.) Lamarck
Bisporella citrina (Batsch : Fr.) Korf & S.E.Carp.
Chlorociboria aeruginosa (Oeder) Seaver ex C.S. Ramamurthi, Korf & L.R. Batra
Clitocybe dealbata (Sowerby : Fr.) Kumm.
Collybia butyracea (Bull. : Fr.) Kumm.
Fomitopsis pinicola (Sw. : Fr.) P.Karst.
Galerina marginata (Batsch) Kühner
Hebeloma laterinum (Batsch) Vesterh.
Hygrophorus agathosmus (Fr.) Fr.
Hygrophorus capreolarius (Kalchbr.) Fr.
Hygrophorus discoxanthus (Fr.) Rea
Hygrophorus lindtneri var. *carpini* (Gröger) Bon
Hygrophorus pudorinus (Fr. : Fr.) Fr.
Laccaria amethystina (Huds. ? Kumm.) Cooke
Lentinellus inolens (Konrad & Maubl.) Konrad & Maubl.
Lepista nebularis (Batsch : Fr.) Harmaja
Lepista nuda (Bull.) Cooke
Lepista sordida (Schumach.) Singer
Lycoperdon perlatum Pers.
Macrolepiota mastoidea (Fr. : Fr.) Singer

Marasmius cohaerens (Pers. : Fr.) Cooke & Quél.
Marasmius oreades (Bolt. : Fr.) Fr.
Marasmius querceus Britzelm.
Marasmius wynneae Berk. & Broome
Mycena pura (Pers. : Fr.) Kumm.
Mycena rosea (Bull. ? Pers.) Gramberg
Pholiota lenta (Pers. : Fr.) Singer
Piptoporus betulinus (Bull. : Fr.) P.Karst.
Plicaturopsis crispa (Pers. : Fr.) D.A. Reid
Ceriporus leptcephalus (Jacq. : Fr.) Zmitr. & Kovalenko
Rhytisma acerinum (Pers.) Fr.
Russula ochroleuca Pers.
Russula sanguinaria (Bull. => Schumach.) Rauschert
Sarcomyxa serotina (Pers. : Fr.) P.Karst.
Stereum rugosum (Pers. : Fr.) Fr.
Suillus granulatus (L.) Roussel
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer
Tricholoma saponaceum (Fr.) Kumm.
Tricholoma stans (Fr.) Sacc.
Tricholoma terreum (Schaeff. : Fr.) Kumm.
Xerula radicata (Rehl. : Fr.) Dörfelt
Xylaria hypoxylon (L. : Fr.) Grev.



¹ La nomenclature suit le référentiel taxonomique TAXREF v14.